



O.L.V. VAN LOURDES

ZIEKENHUIS WAREGEM

Secretariaat kinderartsen  
9u-13u en 14u-17u  
pediatrie@ziekenhuiswaregem.be  
056/62 35 50

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem  
Vijfseweg 150- B-8790 Waregem  
T 056/62 31 11 – F 056/62 30 20  
info@ziekenhuiswaregem.be  
www.ziekenhuiswaregem.be



## Emla of Rapydan

**Om de huid te verdoven voor een prikje**





Wat is  
Emla?

**Emla** is een crème die lokaal op de huid wordt aangebracht en de huid plaatselijk verdooft.

Een doos Emla bevat 1 tube van 5 g huidcrème en 2 pleisters voor uitwendig gebruik.

Emla bestaat ook in pleistervorm. Een doos bevat 2 kleefpleisters die de verdovende stof reeds bevatten, hier hoeft u dus geen zalf aan te brengen, enkel de kleefpleister. Met de zalf heeft u het voordeel dat u meer dan 2 plaatsen op de huid kan verdoven.

**Rapydan** heeft een iets snellere werking dan Emla.

Rapydan bestaat enkel in pleistervorm.

Een doos bevat 2 kleefpleisters.

U gebruikt de kleefpleisters best 30 tot 45 minuten vóór de interventie. Rapydan is echter wel een stuk duurder dan Emla. Rapydan mag gebruikt worden bij kindjes vanaf 3 jaar.

Emla en Rapydan worden gebruikt voor het verdovend effect bij het aanprikken van de huid, bv. vóór een bloedafname. Emla kan ook gebruikt worden bij alle oppervlakkige chirurgische ingrepen ter hoogte van de intacte huid, zoals bv. vóór het verwijderen van waterwratjes.

Zowel de Emla crème als de Rapydan kleefpleisters kan u, onder voorschrift, kopen bij elke apotheek. Rapydan hebben ze niet altijd op voorraad, dit moet u meestal bestellen bij uw apotheek.

Wat is  
Rapydan?





## Hoe Emla aanbrengen?

Controleer of de aangeduide huidzone droog en rein is. Emla mag enkel op een intacte huid worden aangebracht.

- ➔ Voor baby's tot 3 maanden oud gebruik je maximaal 1/10 van een tube op 1 plaats en laat je die maar 1 uur ter plaatse.
- ➔ Baby's tussen 3 maand en 12 maand oud mogen 1/10 tot 1/5 van een tube, die je dan maximaal 4 uur ter plaatse laat.
- ➔ Oudere kinderen mogen tot 1/4 van een tube die ook maximaal 4uur ter plaatse mag blijven.
  
- Breng de crème rechtstreeks uit de tube aan op de aangeduide huidzone. Wrijf de crème niet open.
- De beste zones zijn de handrug en elleboogplooi. Breng de zalf op minimum 2 plaatsen aan.
- Verwijder het middenstuk van de pleister door de pleister bij de rand vast te houden en het beschermende papier weg te nemen.
- Breng de pleister zorgvuldig aan boven de crème, let op een goede afdichting.
- Verwijder de papieren rand en druk de randen nog eens goed aan.
- Wanneer uw kind reageert op kleefpleisters kan u ook gewone huishoudfolie gebruiken om de crème af te dekken. Wikkel deze folie rond de hand of arm en let er op dat hij mooi ter plaatse blijft, maar zonder de hand of arm af te klemmen.
- Draai de dop van de tube terug goed dicht en bewaar de tube tussen 15°C en 25°C. Gebruik dit geneesmiddel niet na de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze is te vinden op het doosje.



### **Wanneer Emla aanbrengen?**

Emla moet ten minste 1 uur tot 1,5 uur vóór de interventie (bloedafname of chirurgische ingreep) worden aangebracht.

Zolang de pleister niet wordt verwijderd, blijft de crème gedurende verschillende uren actief. Ook na het verwijderen van de Emla-crème blijft de huid nog anderhalf uur verdoofd.

De Emla crème mag niet langer dan 4 uur ter plaatse blijven.


### **Wanneer Rapydan aanbrengen?**

Vanaf de leeftijd van 3 jaar mag u ook Rapydan aanbrengen.

U gebruikt de Rapydan kleefpleisters best 30 tot 45 minuten vóór de interventie.

**Noteer hier het uur van aanbrengen:**

.....



### **Mogelijke bijwerkingen?**

Een lichte reactie zoals bleekheid, roodheid, zwelling en jeuk kan zich voordoen op de plaats waar Emla of Rapydan is aangebracht. Deze reacties zijn normaal en verdwijnen snel.

Verwittig zeker de arts als uw kind eczeem heeft.

**Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kan u contact opnemen met uw behandelende arts of met de verpleegkundige op het secretariaat.**